

**GÖKÇEADA'DAKİ (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) AMFİBİ VE SÜRÜNGENLERİN
EKOLOJİSİ**

Akın BULUT, **C. Varol TOK** ve Batuhan Y. YAKIN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale

Bu çalışmada, 2009 yılı mart-kasım ayları ve 2011 yılı ekim, mayıs ve haziran arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda Gökçeada'da dağılışı gösteren 13 amfibi ve sürüngen türüne ait bazı ekolojik veriler yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'nin bir çok yöresinde olduğu gibi adada da yılan olarak bilinen, karnı yarık yılan veya kör yılan olarak tanımlanan *Pseudopus apodus* türüne ait tespit edilen ölü örnekler hakkında bilgi verilmiştir.

Gökçeada'dan toplanan amfibi örnekleri genellikle su kaynaklarının yakınlarında ve su kaynaklarına yakın yolların üzerinde bulunmuştur. Adada en yaygın sürüngen türü *Ophisops elegans* tır. Ayrıca genellikle çok sık rastlanmayan *Pseudopus apodus* türüne ait örnekler adada sık rastlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Amfibi, sürüngen, Gökçeada, ekoloji